

薬草の胃腸薬

食べすぎ・飲みすぎ

胸やけ・胃の不快感に

第2類医薬品

10包

薬草の胃腸薬

新サロミン プレミアム

和漢生薬配合

食べすぎ・飲みすぎ・胸やけ
胃の不快感に



製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

紙箱 中仕切



4 904751 304003

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を1日3回食後に水と一緒に服用してください。

15歳以上 1回1包
11歳以上15歳未満 1回2/3包
8歳以上11歳未満 1回1/2包
5歳以上8歳未満 1回1/3包
3歳以上5歳未満 1回1/4包
3歳未満 服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法及び用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈お問い合わせ先〉

本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。

新生薬品工業株式会社

電話番号 0744-52-3330

受付時間 9:00~17:00

(土日・祝日及び当社休日を除く)

新サロミンプレミアム

押して開ける

1.5g×10包

ケースは本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

第2類医薬品

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)

4. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)高齢者

(4)薬などによりアレルギー症状を起こした

ことがある人(5)次の症状のある人 排尿困難(6)次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【その他の注意】

母乳が出にくくなる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(折る原因になり品質が変わる。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。(5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

発売元 田村薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町2-1-10

¥1,100(税込)